

## Bladvlekkenziekten

Bladvlekkenziekten veroorzaken steeds meer problemen in de teelt van pioenen. Bladvlekkenschimmels en Botrytis zorgen voor verschillende soorten bladvlekken in de pioenroos. Beide schimmels gedijen goed onder warme en vochtige omstandigheden en ze overleven op gewasresten.



*Bladvlekkenaantasting in een pioen      Links Botrytis, rechts bladvlekkenaantasting*

## Symptomen

Bladvlekken zijn goed te onderscheiden van Botrytis. Hieronder de symptomen die optreden bij Botrytis en bladvlekken.

### Botrytis:

- Bij Botrytis is sprake van een lichtbruine vlek waarbij al snel het hele of halve blad is aangetast
- De aantasting zit vaak aan de uiteinden van het blad
- Het ontstaat vanaf de bovenkant
- Onder vochtige omstandigheden is een grijze sporenmassa op het aangetaste blad te vinden

### Bladvlekken:

- Vlekken verspreid over het hele blad
- De vlekken beginnen als licht-/purperrode plekjes
- Later groeien ze uit tot onscherp begrensde, paarsbruine vlekken

## Maatregelen

- Gebruik gezond uitgangsmateriaal
- Na het klepelen/afmaaieren de gewasresten verwijderen
- 's Morgens water geven zodat het gewas droog de nacht in kan
- Spuit preventief met onder andere Daconil, Flint, Ortiva of Switch. Wissel regelmatig tussen de middelen om resistentie te voorkomen