

## **Botrytis**

De eerste behandeling tegen Botrytis vindt tijdens de opkomst plaats. De nieuwe scheut kan al tijdens de opkomst worden besmet, omdat de schimmel overwintert door sporen op de grens van grond en lucht. Aangieten met Collis kan bij een gevoelig soort zoals Flame het aantal omvallers met meer dan 90% verminderen. Pioenen die door de wind en vorst zijn beschadigd, zijn ook gevoeliger. Gewassen waar vorig seizoen na de bloei meer Botrytis aanwezig is geweest, vragen extra aandacht. Wij willen dan ook het belang benadrukken van het tijdig en preventief behandelen van de gewassen. Dat kan een aanzienlijk voordeel opleveren.

De dosering is maximaal 4 liter per hectare en werkt het beste als er in combinatie met veel water zoveel mogelijk op de plant wordt gegoten (voor gevoelige rassen 0,20 liter per plant). Het is vanwege resistentie niet optimaal om regelmatig Collis te gebruiken.

Het losmaken van de bovengrond in tunnels en in de kassen kan de schade door omvallers eveneens aanzienlijk beperken.

De pioen is door zijn snelle groei weinig bestand tegen klimaatwisselingen. Er vormt zich bijna zeker Botrytis op de beschadigingen die daaruit voortvloeien. De schimmel blijft vooral voor grote problemen zorgen als de pioenen niet worden beschermd tijdens de groei. Extra bespuitingen zijn dus zeker nodig in deze kritieke periode. Als goede en effectieve middelen worden vooral Teldor, Kenbyo, Flint, Luna en Switch genoemd.

**Na nachtvorst 2 dagen niet spuiten in verband met een zwak gewas!**

