

Bemesting

De bemesting moet na de bloei worden gericht op de vegetatieve groei van de plant. De bladeren die tot die tijd onder het gewas hebben gezeten, moeten tenslotte nog volgroeien. Het gewas dat nu op de plant staat, vormt de basis voor de bloemenproductie in het volgende jaar. In augustus en september vindt namelijk de bloemaanleg plaats. Neem met regelmaat een grond-/bladmonster in vaste periodes zodat u een beter beeld krijgt van de behoeftes van de plant.

Normale bemestingsgiften kg/ha voor pioen op jaarbasis (bij normale grondwaardering)

N- behoefte	150 kg/ha
Fosfaat, kg P2O5	100 kg/ha
Kali, kg K2O	225 kg/ha
Magnesium, kg MgO	100 kg/ha

Na de bloei bemesting geven voor knopaanleg volgende seizoen

- Kalium, helpt strooien (onder andere Patentkali of Vivikali);
- Stikstof, minimaal 50 kg;
- Magnesium (bitterzout).

Let er in deze periode wel op dat er **voldoende water** beschikbaar is voor de plant. Om de meststoffen op te nemen. Droogte in die periode schaadt namelijk de bloemproductie voor het volgende jaar.

Een actief bodemleven is daarom van belang; vochtige grond en een juist organisch stofgehalte zijn derhalve zeer belangrijk om de opname van de genoemde meststoffen te bevorderen.